




海洋環境における放射能調査




全国の原子力発電所の周辺や原子燃料サイクル施設沖合海域における漁場環境の安全性を見守るため、海産生物、海底土および海水を対象とした放射能調査などを行い、国が実施する海洋環境における放射能調査及び総合評価事業の一環として基礎資料を取りまとめています。

海洋環境における放射能調査

経年的に実施してきた調査結果の一例として原子力発電所等周辺15海域の海水（表層水）のセシウム-137とストロンチウム-90の放射能濃度の推移を示します。ストロンチウム-90の放射能濃度は、調査を開始した1983（昭和58）年度時点ですでに海洋環境で見出されており、以降の調査でその濃度は緩やかな減少傾向で推移していたことを確認しています。同様にセシウム-137についても、1986年度の試料の一部でチェルノブイリ原子力発電所事故の影響と考えられる高い値を示しましたが、その後は緩やかな減少傾向で推移していました。しかしながら、2011年度の調査では、東電福島第一原子力発電所事故に起因する高い値が一部の海域で確認されました。2012年度以降の調査においても引き続き福島県沖の海域を中心に、一部の海域で事故以前の過去5年間（2006～2010年度）の測定値を上回る試料が確認されました。2020年度の調査では、海産生物や海水試料から見出されるセシウム-137とストロンチウム-90の放射能濃度は東電福島第一原子力発電所事故前のレベルとほぼ同様になっています。



採泥器による海底土の採取作業風景



原子力発電所等周辺15海域の海水（表層水）の調査結果


*従来のベータ線（β線）計測では、セシウム-137とセシウム-134を区別して計測できません。東電福島第一原子力発電所事故に由来するセシウム-134を含む可能性があることから、2011年度の分析結果についてはセシウム-134とセシウム-137を合わせた放射性セシウム（セシウム134+137）の値として示しています。一方、2012年度はセシウム-134とセシウム-137を区別して分析できるガンマ線（γ線）計測によって分析しており、グラフはセシウム-137の値を示しています。ちなみに2010年度までの分析もベータ線計測ですが、セシウム-134は事実上含まれていないと考えられるため、すべてセシウム-137の値として示しています。

総合評価のための解析調査

調査結果をみると、海域や生物種の違いにより放射能濃度に差がみられます。この差が生じた原因や機構の解明などといった、総合評価に必要な補完的な支援・解析調査を行っています。

結果解析の一例として、魚類の胃内容物組成に基づいた食性と可食部のセシウム-137の割合*の関係を示します。同じ魚類でも、食性がより高次な魚食性となるにつれて、この割合は高くなる傾向があります。

*ここでいう割合とは、海水中の放射能濃度に対する生物中の放射能濃度の比（生物中の放射能濃度を海水中の放射能濃度で除した値）です。生物中の放射能濃度は海水中の放射能濃度の違いによっても影響されます。



福島県沖および近隣海域における広域モニタリング


2011年3月11日に発生した東電福島第一原子力発電所の事故に伴い、3月23日より東電福島第一原子力発電所周辺海域(30km圏外)について緊急的にモニタリングを開始しました。また、2011年4月22日に原子力災害対策本部により定められた「環境モニタリング強化計画」を受け、5月より福島県のみならず、宮城県沖合から茨城県沖合までの広域的な海域モニタリングを、さらに2013年11月より東電福島第一原子力発電所近傍・沿岸海域(10km圏内)のモニタリングを開始しました。これらのモニタリング結果は、速報値として原子力規制委員会のウェブサイトにて公表されています。

● 海水

東電福島第一原子力発電所周辺海域(30km圏外)における海水中のセシウム-137の放射能濃度は、事故直後の2011年3月下旬より濃度の上昇が始まり、4月15日に最大となりましたが、4月中旬以降は減少に転じています。2011年9月中旬以降は、変化が緩やかになりましたが、全体的に減少傾向を示しています。

2019年11月上旬には、一部測点の表層水で、減少傾向から外れたやや高い濃度が測定されましたが、2020年1月以降には再び減少傾向を示しており、陸域での降雨後の出水による一時的な上昇であったと考えられます。

その後も徐々に減少を続けており、事故以前5年間の濃度範囲に収まりつつあります。しかしながら、近傍・沿岸海域(10km圏内)では、30km圏外に比べて一桁程度高い値となっています。




海水中におけるセシウム-137の放射能濃度の変化

* 図中の■帯の範囲は、別途実施している調査結果から、宮城海域、福島第一海域、福島第二海域および茨城海域において、東電福島第一原子力発電所事故以前5年間(2006～2010年度)に測定された海水(表層水)中のセシウム-137の濃度範囲(0.0011～0.0024ベクレル/リットル)を示しています。

● 海底土

海底土の表層(0～3cm)のセシウム-137の放射能濃度は、海水のように時間とともに速やかに減少するといった変化を示しておらず、事故後観測点間にばらつきはあるものの2011年秋には最大値を示し、その後は緩やかに減少傾向に転じています。一方水平的な濃度分布は、必ずしも発電所からの距離により決まるものではなく、事故直後の海水の移動経路、海底土の組成などが関連している可能性があります。海底土に含まれるセシウム-137の濃度減少は、主に海底土の再懸濁と水平移動によるものと考えられますが、底生物の海底土表層攪乱による下方移動や海底土からの溶出・脱着も同時に影響を与えている可能性もあります。



海底土におけるセシウム-137の放射能濃度の変化

